
FÖRBEREDELSE FÖR GASTROANEL-UNDERSÖKNING

fP-GastPan

Syfte med undersökningen

Med en GastroPanel-undersökning utreds symtom i övre buken, skador på magsäckens slemhinna och risker med anknytning till detta samt fastställs eventuell helicobakterinfektion och syrabrist i magsäcken.

Förberedelser för undersökningen

Ett blodprov tas på laboratoriet och 4–10 timmar före provtagningen får du inte äta, dricka eller röka. Läkemedel som påverkar utsöndringen av magsaft avbryts på ordination av läkare.

Du ska inte ta läkemedel som påverkar utsöndringen av saltsyra **en vecka** före provtagningen

Saltsyrahämmare:

- Ranitidin (Ranisan, Ranitidin Mylan, Ranitidin Sandoz, Ranixal brustablett, Ranixal tablett, filmdragerad, Zantac)
- Famotidin (Famotidin, Pepcid, Pepcidin, Pepcid Duo)

Protonpumpshämmare:

- Esomeprazol (Esomeprazol Orion, Esomeprazol Ratiopharm, Esomeprazol Sandoz, Nexium, Nexium 10 mg entero granulat till oral suspension)
- Lansoprazol (Gasterix, Lansoprazol Actavis 15 mg, Zolt)
- Omeprazol (Losec, Losec Mups, Omeprazol Actavis, Omeprazol Pensa, Omeprazol Ratiopharm, Omeprazol Sandoz, Omestad)
- Pantoprazol (Pantoprazol Actavis, Pantoprazol Pensa 20 Mg Enterotablett, Pantoprazol Pensa 40 Mg Enterotablett, Pantoprazol Sandoz, Panzor, Somac Control, Somac Enterotablett, Somac pulver till injektionsvätska)
- Rabeprazol; Pariet

Ett dygn före provtagningen av magsaften ska du inte ta läkemedel som neutraliserar magsaften

Antacider:

- Galieve Mint, Galieve Peppermint, Gaviscon, Magnesiummjölk, Rennie, Rennie Icemint, Rennie Lakrits, Rennie Spearmint

Läkemedel som skyddar magslemhinnan:

- Antepsin

Tillsammans med provet ska det finnas information om behandling av helicobacter, halsbränna och överproduktion av magsyra samt användning av värkmedicin. Om du har avvikit från anvisningarna ska du informera provtagaren om detta.