

CHLAMYDIA TRACHOMATIS JA NEISSERIA GONORRHOEAE, VIRTSANÄYTE U-CtGcNhO

Ennen näytteenottoa

Ole virtsaamatta ja tekemättä alapesua vähintään 2 tuntia ennen näytteenottoa.

Näytteenotto

Alapesua ei suoriteta. Virtsatkaa normaalisti alkuvirtsaa laboratorion saatuun virtsanäytepurkkiin 20-30 ml. Virtsan ensimmäiset pisarat ovat tärkeitä saada astiaan. Loppuvirtsan voitte laskea wc-altaaseen.

Virtsanäytteen siirtäminen näyteputkeen

Näyteputki sisältää nestettä, jota ei saa heittää pois. Siirtäkää virtsaa pipetillä näyteputkeen niin, että nestepinta on kahden mustan merkkiviivan välissä (= "ikkuna"). Sulkekaa näyteputken korkki tiiviisti.

Kiinnittäkää nimellä, henkilötunnuksella ja näytteenottopäivämäärällä varustettu tarra näyteputkeen. Tarra ei saa peittää putkessa olevaa "ikkunaa".



Näytteen säilytys ja kuljetus

Tuokaa näyteputki mahdollisimman pian näytteenoton jälkeen laboratorioon. Jos näytettä täytyy säilyttää kotona, säilyttäkää se huoneenlämmössä.