

Arvoisa asiakas,

Otamme uuden yhdistelmätestin tutkimusvalikoimaan

Papilloomaviruksen osoitus ja gynekologinen irtosolututkimus, ehdollinen yhdistelmätesti

-HPVPapa ATK 9929

Osatutkimukset

-HPVhO KL 4075

Pt-Papa-1 KL 4044

Ehdollista yhdistelmätestistä varten otetaan sekä HPVhO- että Papa-näyte. HPV-näyte tutkitaan ensin ja sen ollessa suuren riskin HPV-tyyppien suhteen positiivinen, tutkitaan myös Papa-näyte. Jos HPV-näyte on negatiivinen, ei Papa-lasia tutkita.

Kun positiivisen HPV-testin jälkeen tehdään sytologinen jatkotesti, on seulonnan tarkkuus ja positiivinen ennuste arvo Papa-kokeeseen verraten yli 35-vuotiailla jopa parempi kuin pelkällä Papa-kokeella¹. Negatiivinen HPV-tulos mahdollistaa haluttaessa pidemmän seulontavälin kuin Papa-kokeella seulottaessa, sillä vaikeat esiasteet ja syövät kehittyvät pääasiassa HPV-positiivisille¹.

Indikaatit

Yli 30-vuotiaiden naisten kohdunkaulamuutosten diagnostiikka ja seulonta.

Näytteiden lähetys

Papa-lasikotelo ja HPVhO-näyte tulee pakata samaan muovipussiin tai liittää kumilenkillä yhteen. Lähetys huoneenlämmössä YML:n Espoon toimipisteeseen.

Teksti

-HPVhO 2 x vko

Pt-Papa-1 5 x vko

Vastausaika

3-9 arkipäivää

Viite

1. Leinonen M.K., Anttila A., Nieminen P. Papilloomavirustartunta ja HPV-testin toimivuus kohdunkaulan syövän seulonnassa. Suomen Lääkäril 2015; 70:1243-1250.

Pyydämme teitä olemaan yhteydessä tietohallintoomme sähköisen liikenteen testaamisessa.

Tiedustelut:

kemisti Marika Havana
puh. 050 349 8446
marika.havana@medix.fi

Hintatiedustelut:

asiakasyhteyspäällikkö Anne Knaapila
puh. 050 409 0864
anne.knaapila@medix.fi

patologi Anna Bützow
puh. 050 301 8431
anna.butzow@medix.fi