

Arvoisa asiakas,

Tutkimuksen lopetus

Mononukleoosi, vasta-aineet (kval), vieritesti **S -MonAb-O KL 2360**

Poistamme valikoimastamme nieluinfektion etiologian selvittelyyn ja erityisesti Epstein-Barrin viruksen aiheuttaman mononukleosin pikadiagnostiikkaan tarkoitetun mononukleoosi-vieritestin.

Mononukleoosi-testi jää jopa 50 prosentilla lapsipotilaista ja 10-20 prosentilla aikuispotilaista virheellisesti negatiiviseksi. Muussa kuin vieritestauksessa tulisivin käyttää kaikilla ikäryhmillä herkempää ja spesifisempää Epstein-Barrin virusvasta-aineiden määrittystä, jossa tutkitaan sekä IgG- että IgM-luokan vasta-aineet.

Epstein-Barrin virus, vasta-aineet **S -EBVAb KL 1335**

sisältää osatutkimukset **S -EBNAAb KL 4109** **S -EBVAbM KL 1337**

S -MonAb-O pyynnöllä tulleet näytteet analysoidaan, jos ne ovat saapuneet laboratorioon 29.9.2016 mennessä. 1.10. alkaen näytteitä ei enää analysoida.

Tiedustelut:

sairaalamikrobiologi Anna Muotiala
puh. 040 575 2096
anna.muotiala@medix.fi