

Arvoisa asiakas,

Tutkimus -InfABNh korvataan alihankintatutkimuksella -InABRSV

Valikoimasta poistuva tutkimus:

Influenssa A- ja B-virus, nukleiinihappojen osoitus

-InfABNh ATK 9407

Influenssa A- ja B-viruksen sisältävä tutkimus korvataan entistä laajemmalla pakettitutkimuksella. Pakettiin lisätään RS-virus ja tutkimus siirretään alihankintaan.

Uusi tutkimus:

Influenssa A, B ja RSV, nukleiinihappo (kval)

-InABRSV ATK 92539

Osatutkimukset

-InfANhO KL 4896

-InfBNhO KL 6194

-RSVNhO KL 6198

Indikaatiot Influenssa- ja RS-virusinfektioiden diagnostiikka. Vieritestin jatkotutkimus tuloksen ollessa epävarma tai ristiriitainen potilaan kliinisen kuvan kanssa.

Näyte Nenän molemmista sieraimista ja nielusta otettu tikkunäyte.

Näyteastia Copan UTM (Universal Transport Medium) -putki ja kaksi nukkatikkua. Tikkunäyte otetaan kahteen näytetikkuun (molemmista sieraimista yhteen tikkuun ja nielusta toiseen) herkkyyden lisäämiseksi. Molemmat tikut laitetaan samaan näyteputkeen.

Näytteenotto-ohje

Sierainnäyte: Näytteenottotikku (dacron tai nylontikku) viedään sieraimen n. 3-4 cm syvyyteen ja kiertoliikkeellä hangataan nenän limakalvoja siten, että tikkuun tarttuu nenän limakalvolta irronneita soluja. Samalla tikulla kerätään soluja myös toisesta sieraimesta. Tikku työnnetään kuljetusnestettä sisältävään putkeen siten, että tikun pää osuu nesteeseen ja tikku katkaistaan

Nielunäyte: Näytteenottotikulla pyyhitään tukevasti nielukaaria ja nielun takaseinän limakalvoa siten, että tikkuun tarttuu limakalvolta irronneita soluja. Tikku työnnetään samaan näyteputkeen sieraintikun kanssa ja tikku katkaistaan.

Influenssa A&B pikatestipuskuri: Vieritesti suoritetaan ohjeen mukaan. Uuttoputkessa jäljellä oleva näytepuskuri, siirretään UTM-putkeen. Kaikkien pikatestien yhteensopivuutta UTM-puskurin kanssa ei ole voitu varmistaa. Actim® on yhteensopiva.

Säilytys ja lähetys

Näytteenoton jälkeen varmistetaan, että näyteputken korkki on tiiviisti suljettu. Näyte toimitetaan tutkivaan laboratorioon mahdollisimman pian. Näyte säilyy jääkaapissa 3 vrk. Lähetys huoneenlämmössä, mikäli näyte on perillä näytteenottopäivänä, muuten kylmälähetys.

Menetelmä	reaaliaikainen käänteiskopiointi-polymeraasiketjureaktiolla (RT-PCR)
Vastausaika	3 arkipäivää
Tekotiheys	arkipäivisin (ma-pe)
Tulkinta	Normaalisti negatiivinen.

Tutkimus -InfABNh on tilattavissa 25.1.2017 asti. Uusi tutkimus -InABRSV on tilattavissa 26.1.2017 alkaen.

Tiedustelut:

alihankintakoordinaattori Heidi Konttinen
puh. 050 431 4532
heidi.konttinen@medix.fi

Hintatiedustelut:

asiakasyhteyspäällikkö Anne Knaapila
puh. 050 409 0864
anne.knaapila@medix.fi

sairaalamikrobiologi Anna Muotiala
puh. 040 575 2096
anna.muotiala@medix.fi