

Arvoisa asiakas,

Tekopaikkamuutos

Oreksiini A (Hypokretiini-1)
Li-OreksA KL 4943

Siirrämme tutkimuksen tehtäväksi toiseen alihankintalaboratorioon. Muutoksen myötä tutkimusta tehdään useammin, joten vastausaika lyhenee. Myös viitearvot muuttuvat. Menetelmänä on edelleen RIA.

Tekotiheys 1 x vko

Vastausaika 12 arkipäivää

Viitearvot yli 200 pg/ml

Tulkinta Oreksiini A:n pitoisuus selkäydinnesteessä on selvästi alentunut narkolepsiassa. Alentunut arvo yhdistyneenä päiväväsyyntymykseen ja katapleksia-anamneesiin varmistaa narkolepsiadiagnoosin. Mikäli tutkittavalla on todettu lyhentynyt nukahtamisviive (MSLT-tutkimus) ja katapleksia-anamneesi on kiistaton, on likvorin oreksiini erittäin harvoin normaali. Likvorin oreksiinimääritys on hyödyllinen myös, jos katapleksia-anamneesi on epävarma. Esimerkiksi lapsilla ja nuorilla katapleksia voi alkaa useita vuosia nukahtelukohtausten jälkeen. Oreksiini A:n pitoisuus alle 110 pg/ml viittaa narkolepsiaan, pitoisuus 110 - 200 pg/ml on raja-arvo ja voi olla merkki narkolepsiasta.

Muutokset koskevat niitä tuloksia, joiden vastaamispäivä on 3.5.2017 ja siitä eteenpäin.

Tiedustelut:

kemisti Tea Lamberg
puh. 043 825 9316
tea.lamberg@medix.fi

alihankintakoordinaattori Heidi Konttinen
puh. 050 431 4532
heidi.konttinen@medix.fi