

MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS, VILJELY JA VÄRJÄYS, YSKÖS 4027 Ex-TbVi

Keuhkotuberkuloosin tai atyyppisen mykobakteerin aiheuttaman keuhkoinfektion epäily.

Näytteenottovälineet

- Näytepurkki, kuiva, kierrekorkillinen, 3 kpl
- Nimitarrat, 3 kpl
- Muovipussi (esim. Minigrip), 3 kpl

Näytteenotto

Yskösnäytteet otetaan ennen ruokailua. Tärkeää on saada edustavat näytteet mahdollisimman syvältä keuhkoista.

Näytteet otetaan kahtena peräkkäisenä päivänä: 1. aamulla, 2. päivällä ja 3. seuraavana aamuna. Tehokas ja syvä yskiminen on tärkeää, jotta tutkittavaa materiaalia on tarpeeksi.

- Yskäise näyte suoraan avattuun näytepurkkiin. Yskösmateriaalia tulee olla runsaasti (2-5 ml). Pelkkä sylki tai nenänielun erite eivät kelpaa tutkittavaksi.
- Näytepurkki suljetaan huolellisesti.
- Purkkeihin kiinnitetään laboratorion saatu valmis tai itse täytetty nimitarra. Tarrassa täytyy olla nimi, henkilötunnus ja näytteenottopäivämäärä.
- Näytteenoton jälkeen näytepurkit pakataan yksittäin muovipusseihin, jotka suljetaan huolellisesti.

Säilytys ja kuljetus

Näytteet voi säilyttää kotona jääkaapissa (+2 °C – +8 °C). Kaikki kolme näytettä voi tuoda kerralla laboratorioon, mahdollisimman pian viimeisen näytteen oton jälkeen.