

CHLAMYDIA TRACHOMATIS JA NEISSERIA GONORRHOEAE, NUKLEIINIhapPO, LIMAKALVO

-CtGcNho (1738)
(Vaginanäyte)

Chlamydia trachomatis -infektion epäily ja tippurin poissulkudiagnostiikka.

Näytteenottovälineet

- APTIMA Multitest Swab -näyteputki
- Vaaleanpunainen näytteenottotikku
- Nimitarra näytteenottoputkeen



Näytteenotto

Näytteenottoputken korkki avataan ja putki asetetaan tasaiselle alustalle, jotta sen sisältämä säilytysneste ei pääse valumaan pois. Vaaleanpunaisen näytteenottotikun suojapussi avataan varren puoleisesta päästä. Näytteen ottamiseen tarkoitettuun nukkapäähän ei tule koskea sormilla.

Vaginanäyte: Näytteenottotikku viedään emättimeen noin 5 senttimetrin syvyyteen ja pyöritetään sitä noin 30 sekunnin ajan siten, että tikun nukkapää hankaa emättimen seinämää.

Näytteenoton jälkeen: Näytteenottotikku laitetaan nukkapää edellä näyteputkeen.

Tikun katkaisu: Tikussa on musta viiva osoittamassa katkaisukohtaa. Tikku katkeaa parhaiten heti mustan viivan alapuolelta. Nosta tikkua putkessa ylöspäin siten, että musta viiva on näkyvässä juuri putken reunan yläpuolella. Katkaise tikku putken reunaan vasten. Tikun näytepää jää putkeen.

Muista sulkea korkki huolellisesti. Tarraan kirjoitetaan henkilötiedot, näytteenotto kohta (vagina/peräaukko) sekä päivämäärä. Tarra liimataan näytteenottoputkeen.

Säilytys ja kuljetus

Näyte toimitetaan laboratorioon samana päivänä näytteenoton jälkeen tai viimeistään seuraavana arkipäivänä. Näytteen säilytys ja kuljetus huoneenlämmössä (2 - 30°C).