

SIENI, VILEJLY

Sk-SienVi (3509 sis. natiivitutkimuksen)

Pinnallisen dermatofyytti-, hiiva- tai muun sieni-infektion epäily.

Valmistautuminen näytteenottoon

Lääkepitoisuudet säilyvät suurina iholla ja kynnessä pitkään sienilääkkeen käytön lopettamisen jälkeen. Tutkimustiedon perusteella luotettavia varoajoja ei näytteenoton kannalta voida määrittää.

Varoajat näytteenottoon lääkityksen lopetuksen jälkeen

	Ihoinfektionäyte	Kynsi-infektionäyte
Ulkoisen sienilääkitys (paikallishoito)	2 viikkoa	6 viikkoa
Sisäinen sienilääkitys (systeeminen)	2 kuukautta	6 kuukautta
Amorolfiini hoitolakka		3 kuukautta

Muuta huomioitavaa

- Kynsilakka poistetaan ennen näytteenottoa.
- Kynsiä ei leikata lyhyeksi ennen näytteenottoa.
- Syömistä, juomista ja desinfektioaineiden käyttöä vältetään juuri ennen suu- ja nielunäytteenottoa.

Laboratoriolle ilmoitetaan aiemmin käytetyt sienilääkitykset (lääke, kesto, lopetus) sekä mahdollinen ulkomaanmatka ennen infektion alkamista.