

HELICOBACTER PYLORI, ANTIGEENI, ULOSTE

F –HepyAg (3952)

Helicobacter pylori -infektion osoittaminen ja helikobakteerihäätöhoidon onnistumisen seuranta.

Näytteenottovälineet

- Ulostepurkki, kuiva/kierrekorkillinen
- Kertakäyttöinen näyteastia
- Nimitarra
- Muovipussi (esim. Minigrip®)

Valmistautuminen näytteenottoon

Ennen näytteenottoa on vältettävä tiettyjä lääkkeitä. **Lääkitysten keskeyttämisestä sovitaan aina lääkärin kanssa.**

Lääkkeitä, joita ei voi ottaa yhteen (1) vuorokauteen ennen tutkimusta

- Suolahapon erityksen estäjät: Cytotec, Famotidin Stada, Pepcid, Ranisan, Ranitidin Mylan, Ranixal, Zantac, Inside Brus, Ranitidin-Ratiopharm
- Suolen motiliteettiin vaikuttavat lääkeaineet: Constella, Gaspid, MCP-Ratiopharm, Metoclopramide Accord, Metoclopramide Orion, Motilium, Motilium Takeda, Motilium Tropfen, Primperan, Resolor, Mestison, Ubretid Takeda Pharma
- Antasidit: Balancid Novum, Magnesiamaito, Rennie, Natriumbikarbonat Recip
- Limakalvon suoja-aineet: Antepsin, Galieve, Gaviscon

Lääkkeitä, joita ei voi ottaa kahteen (2) viikkoon ennen tutkimusta

- Protonipumpun estäjät: Acidal, Esomeprazol Actavis, Esomeprazol Krka, Esomeprazol Orion, Esomeprazol Ratiopharm, Esomeprazol Sandoz, Gasterix, Lanrec, Lansoprazol Krka, Lansoprazol Mylan, Lansoprazole, Lantil, Lanvone, Losec, Nexium, Omeprazol Actavis, Omeprazol Ratiopharm, Omeprazol Sandoz, Omestad, Pantopratsoli Sun, Pantoprazol Actavis, Pantoprazol Krka, Pantoprazol Mylan, Pantoprazol Orion, Pantoprazole Ratiopharm, Pariet, Rabeprazol Krka, Somac, Somac Control, Zolt.

Lääkkeitä, joita ei voi ottaa neljään (4) viikkoon ennen tutkimusta

- Kuuriuonteiset antibiootit
- Helikobakteerin häätöhoidot: Helipak A, Helipak K

Näytteenotto

- Ulostetaan kertakäyttöastiaan. Ulosteseen ei saa sekoittua virtsaa. Siirretään ulostetta purkin kannessa kiinni olevalla lastalla heti ulostamisen jälkeen purkkiin noin yhden teelusikallisen verran. Vетinen ripulinäyte ei sovellu näytteeksi. Purkki suljetaan huolellisesti ja purkin ulkopuolen tulee olla puhdas. Kiinnitetään laboratorion saatu valmis tai itse täytetty nimitarra ulostepurkkiin. Tarrassa täytyy olla nimi, henkilötunnus ja näytteenottopäivämäärä.
- Näytteenoton jälkeen ulostepurkki pakataan muovipussiin, joka suljetaan huolellisesti.

Säilytys ja kuljetus

Näyteputki on tuotava laboratorioon mahdollisimman pian, mieluiten jo näytteenottopäivänä. Näytteen säilyvyysaika on 3 vrk jääkaapissa (2-8°C).