

---

**VALMISTAUTUMINEN Helicobacter pylori urea- kokeeseen  
PT-Hepy-R****Pyydämme huomioimaan ennen näytteenottoon saapumistanne seuraavat asiat**

Näytteenottoa edeltävänä päivänä voitte syödä ja juoda normaalisti. Alkoholin käyttöä ja rankkaa liikuntaa tulisi välttää näytteenottoa edeltävänä päivänä.

Ennen tutkimusta tulee olla syömättä ja juomatta kuusi (6) tuntia. Alkoholin käyttö on kielletty 12 tuntia ja tupakointi ½ tuntia ennen tutkimusta (pieni vesimäärä ja tavanomaiset lääkkeet ovat sallittuja).

Ennen näytteenottoa on oltava hereillä vähintään yksi (1) tunti. Ruumiillista rasitusta on vältettävä ennen näytteenottoa.

**Lääkkeitä, joita ei voi ottaa yhteen (1) vuorokauteen ennen tutkimusta**

*Suolahapon erityksen estäjät*; Cytotec, Famotidin Hexal, Pepcid, Pepcid Duo, Ranisan, Ranitidin Mylan, Ranitidin Sandoz, Ranixal, Zantac.

*Suolen motiliteettiin vaikuttavat lääkkeaineet*; Primperan, Prepulsid, Mestinon, Ubretid Takeda Pharma

*Antasidit*; Balancid Novum, Galieve, Gaviscon, Link, Magnesiummaito, Rennie

*Limakalvon suoja-aineet*; Antepsin

**Lääkkeitä, joita ei voi ottaa kahteen (2) viikkoon ennen tutkimusta**

Kuuriluonteiset antibioottihoidot

*Protonipumpun estäjät*; Esomeprazol, Esomeprazol Ratiopharm, Esomeprazol Sandoz, Gasterix, Lanzoprazol Actavis, Losec, Losec MUPS, Nexium, Omeprazol Actavis, Omeprazol Pensa, Omeprazol Ratiopharm, Omeprazol Sandoz, Omestad, Pantoprazol Actavis, Pantoprazol Pensa, Pantoprazol Sandoz, Panzor, Pariet, Somac, Somac Control, Zolt.

**Lääkkeitä, joita ei voi ottaa neljään (4) viikkoon ennen tutkimusta**

*Helikobakteerin häätöhoidot*; Helipak A, Helipak K