
VALMISTAUTUMINEN GASTROPANEL –TUTKIMUKSEEN fP-GastPan

Tutkimusten tarkoitus

GastroPanel-tutkimuksella selvitetään ylävatsaoireita, mahalaukun limakalvovaurioita ja niihin liittyviä riskejä sekä saadaan selville mahdollinen helicobakteeri-infektio ja hapoton maha.

Tutkimukseen valmistautuminen

Laboratoriossa otetaan verikoe, jota ennen tulee olla **4-10 tuntia syömättä, juomatta ja tupakoimatta.**

Mahanesteiden eritykseen vaikuttava **lääkitys keskeytetään lääkärin luvalla.**

1 viikko ennen näytteenottoa suolahapon eritystä estäviä lääkkeitä ei tule käyttää

Suolahapon erityksen estäjät:

- Ranitidiini (Ranisan, Ranitidin Mylan, Ranitidin Sandoz, Ranixal poretabletti, Ranixal tabletti kalvopäällysteinen, Zantac)
- Famotidiini (Pepcid, Pepcid Duo)

Protonipumpun estäjät:

- Esomepratsoli (Esomeprazol Orion, Esomeprazol Ratiopharm, Esomeprazol Sandoz, Nexium, Nexium 10 mg enterorakeet oraalisuspensiota varten)
- Lansopratsoli (Gasterix, Lansoprazol Actavis 15 mg, Zolt)
- Omepratsoli (Losec, Losec Mups, Omeprazol Actavis, Omeprazol Pensa, Omeprazol Ratiopharm, Omeprazol Sandoz, Omestad)
- Pantopratsoli (Pantoprazol Actavis, Pantoprazol Pensa 20 Mg Enterotabletti, Pantoprazol Pensa 40 Mg Enterotabletti, Pantoprazol Sandoz, Panzor, Somac Control, Somac Enterotabletti, Somac Injektiokuiva-Aine, Liuosta Varten)
- Rabepratsoli; Pariet

1 vuorokausi ennen näytteenottoa mahanesteitä neutraloivia lääkkeitä ei tule ottaa

Antasidit:

- Galieve Mint, Galieve Peppermint, Gaviscon, Magnesiummaito, Rennie, Rennie Icemint, Rennie Lakritsi, Rennie Spearmint

Limakalvon Suoja-Aineet:

- Antepsin

Näytteen mukana on toimitettava tieto helicobakteerin häätöhoidosta, närästysoireista ja liikahappoisuus- ja särkylääkkeiden käytöstä. Jos ohjeista on poikettu, ilmoitetaan siitä näytteenottajalle.